

SAMENVATTING
KENNISDOCUMENT

ROEK

(Versie 1.0 2017)



KENMERKEN VAN ROEK:

- De lengte van de roek is ongeveer 41 tot 49 centimeter lang en heeft een spanwijdte van 81 tot 94 centimeter
- Het verenkleed is geheel zwart, met een purperen glans, de zijdeachtige bevedering op de nek, hoofd en schouders is zeer dicht
- De vogel heeft geheel zwarte poten met een snavel die grijszwart, slanker en puntiger is dan die van een zwarte kraai, kenmerkend voor adulte roeken is de naakte, grijswitte snavelwortel die tot het oog reikt
- Een juveniel heeft een doffer verenkleed en een bevederde snavelwortel, en is te onderscheiden door de snavelvorm, het steilere voorhoofd en de puntigere kruin
- De loop van deze vogel is veelal waggelend en hippend

EISEN WAAR EEN HABITAT AAN MOET VOLDOEN:

- De roek leeft vooral in gebieden die bestaan uit vochtige gras- en bouwlanden met verspreid staande clusters van bomen, vooral boombestanden die bestaan uit meerdere soorten bomen en struiken hebben zijn voorkeur. Ook in parklandschappen en parken, vaak gelegen aan de randen van vochtige landbouwgebieden kan je roeken aantreffen
- Foerageren doen roeken veruit het meest op vochtige, door melkvee begraaide en/of bemeste graslanden en op (pas bewerkt) akkerland. Vooral in het voorjaar en in het begin van de zomer is de behoefte aan deze terreinen zeer sterk, aangezien de jongen vrijwel geheel gevoed worden met dierlijk voedsel dat in de bodem wordt gevonden. In het centrale rivierengebied foerageert de soort op graslanden op rivierklei
- Het nest van een roek wordt gemaakt uit een bouwsel van takken
 - Bij de roek is niet elk nest het volgende jaar weer in gebruik als nestplaats. Er kan gesteld worden dat elk nest dat minimaal twee opeenvolgende broedseizoenen als nestplaats in gebruik is geweest, in de daaropvolgende jaren met een aanzienlijke kans opnieuw gebruikt zal worden
 - Er bestaan meerjarige nesten deze meerjarige nesten zijn meer dan twee jaar achtereenvolgend in gebruik als nestplaats. Meerjarige nesten zijn groter van omvang, zowel qua breedte als in dikte. Deze meerjarige nesten bevinden zich vaak centraal in de kolonie
 - De roek broedt in kolonies van één of meer nesten bijeen. Deze kolonies bevinden zich vaak in clusters van grote bomen (roeken kunnen in vrijwel alle boomsoorten broeden) in de nabijheid van geschikt foerageergebied, maar niet per definitie grenzend hieraan
 - Roeken zijn erg trouw aan een locatie, zeker bij (herhaald) broedsucces. Het nest dient jaarrond als een oriëntatiepunt voor de roeken
- In het najaar en de winterperiode is er sprake van winterslaapplaatsen. De exemplaren van één of meerdere kolonies, soms aangevuld met andere roeken uit oost Europa of andere kraaiachtigen
 - Roeken zijn over het algemeen plaatstrouw aan de winterslaapplaatsen, maar ze zijn zeer flexibel in het gebruik van geschikte winterslaapplaatsen
 - De afstand tussen geschikt foerageergebied en de winterslaapplaatsen is met een gemiddelde van 5 tot 10 kilometer en een uitloop tot 25 kilometer significant groter dan bij de nesten
- Voor beide nestplaatsen en winterslaapplaatsen zijn er een aantal criteria waar deze aan moeten voldoen:
 - Er moeten voldoende 'volwassen' bomen van minimaal 15 meter hoog, incidenteel lager (tot 7 meter), aanwezig zijn die voldoende stevige takvorken bevatten
 - Er moet een gevarieerd boomsoortenbestand zijn, waarvan in ieder geval een deel aansluit bij de voorkeur van de lokale populatie. Naast de nestbomen moet er ook het gehele jaar voldoende takmateriaal beschikbaar zijn voor de nestbouw
 - Er moet minimaal 1,5 hectare (vochtig) bemest gras- of bouwland per broedpaar aanwezig zijn in een straal van 1.500 meter van de locatie waar de kolonie zich bevindt. Dit grasland moet voorzien in voldoende voedselaanbod in de vorm van ongewervelde bodemfauna tijdens de cruciale jongenfase. Ook moeten de roeken op die plekken niet verjaagd of bejaagd worden
 - Voldoende houtwallen, heggen, hagen, poelen en kleine bosjes die behalve voor een broedgelegenheid ook zorgen voor een groot en gevarieerd insectenaanbod



	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Activiteiten die de nestlocatie vernietigen of aantasten												
Activiteiten die het nest verstoren of weghalen												
Activiteiten die alleen de habitat beïnvloeden												
Verplaatsen van de nesten												
	Activiteiten kunnen in principe niet uitgevoerd worden											
	Activiteiten kunnen mogelijk uitgevoerd worden. Het nest is het gehele jaar door beschermd. Raadpleeg een roekdeskundig voor de eventuele mogelijkheden.											
	Activiteiten kunnen in principe uitgevoerd worden											

- Het verbeteren van de kwaliteit van bestaand of het realiseren van nieuw geschikt habitat voor roeken kan zorgen voor het voorkomen van te veel negatieve impact op de kolonie, van belang is dit tijdig en buiten de invloedssfeer van de activiteiten te realiseren
- Als door de activiteiten essentiële onderdelen van het leefgebied niet (meer) aanwezig zullen zijn, kunnen voorafgaand aan de start van de activiteiten maatregelen worden genomen, deze maatregelen zijn:
 - Ervoor zorgen dat er voor een periode van minimaal 10 jaar voldoende hoge, opgaande boombegroeiing beschikbaar is en blijft binnen een straal van 4 kilometer van de bestaande kolonie(s), zodat er ruimte is voor de ontwikkeling van sub kolonies
 - Zorgen voor geschikte nestbomen en nestmateriaalleveranciers binnen een straal van 50 meter van de nestbomen
 - Aanplanten van (snelgroeiende) bomen. In de praktijk zullen de meeste van deze bomen pas bij een leeftijd van minimaal 20 jaar dienst kunnen doen als nestboom voor roeken (pas op lange termijn effectief)
 - Voor een periode van minimaal 10 jaar behouden of ontwikkelen van voldoende geschikt foerageergebied (minimaal 1,5 hectare bemest, vochtig gras- en bouwland per broedpaar) binnen een straal van 1.500 meter van de broedlocatie, en geen vrijstelling van het gebruik van een jachtgeweer
- Het ongeschikt maken van de nestlocaties, tijdig voorafgaand aan de activiteiten moeten de oorspronkelijke verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden om te voorkomen dat de verblijfplaatsen bewoond zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten
 - Er moeten binnen of aangrenzend aan het gebied van de metakolonie geschikte alternatieve plekken voor verblijfplaatsen aanwezig zijn
 - De werklocatie moet vóór het voortplantingsseizoen ongeschikt gemaakt worden voor vestiging door de bomen te kappen en alle bomen van de betreffende (deel)kolonie moeten voor het voortplantingsseizoen leeggemaakt worden van nesten
 - Er moet gezorgd worden dat hervestiging voorkomen wordt door stelselmatig en tijdens de gehele broedperiode verschillende afschrikwekkende maatregelen (zoals angstkreten, geluidsknallen, reflecterende linten). Bovendien moeten nesten in aanbouw op deze en nieuwe maar ongewenste locaties verwijderd worden, waarbij nesten waar mogelijk al op gebroed wordt, met rust worden gelaten